



Champagne-Ardenne

Bulletin n°336 du 23/10/96 : 1 page

d'après les observations du 22/10/1996

CEREALES

Stade : 11 (1 feuille) à 13 (3 feuilles).

Pucerons


Le vol de *Rhopalosiphum padi* s'est fortement calmé depuis la semaine dernière (voir graphique). Le faible niveau d'infestation des pôts pièges ne permet pas de conclure quant au pouvoir virulifère de ces pucerons. Les infestations en parcelles restent le plus souvent faibles (0% à 5%), avec toutefois quelques exceptions qui atteignent le seuil d'intervention.

% de pieds porteurs de pucerons

Communes	% pieds infestés
08 Suginy	16 %
Monthois	0 %
10 Arrentières	19 %
Ville/Arce	0 %
Villiers s/s Praslin	1 %
Pavillon Ste Julie	0 %
Charmont s/s Barbuise	4 %
51 Souain	8 %
Beime Nouroy	8 %
Voipreux	10 %
Vanault Ch.	22 %
Crugny	4 %
Condé s/ Marne	6 %
St Quentin les Marais	80 %
Breuvy / Coole	0 %

■ *Le redoux actuel va provoquer une montée des infestations dans les parcelles. Surveiller de près les parcelles abritées et non traitées GAUCHO. Le seuil d'intervention est de 10 % de plantes colonisées. ATTENTION, ce seuil est déjà largement dépassé dans quelques situations (voir tableau ci-dessus).*

Captures de *R. padi* à la tour de Lavannes



Cicadelles

Dans le réseau de piégeage SPV-FDGEDA Aube-GEDA Marne, les captures de *Psammotettix* (seules cicadelles vectrices de viroses) sont en baisse.

■ *Il n'y a toujours pas d'intervention spécifique à prévoir.*

COLZA

Les stades sont hétérogènes : de 13 (3 feuilles) à 30 (début élongation de la tige).

Ravageurs

Le vol des **Charançons du Bourgeon Terminal** continue dans l'Aube et a débuté la semaine dernière dans l'Argonne. Les **altises** sont rares dans la Marne, alors que dans l'Aube, ces insectes sont toujours piégés en nombre important. Les **pucerons** restent à un niveau d'infestation généralement faible, de l'ordre de 0% à 4%. Quelques exceptions dans l'Aube :
Arrentières 28% de pieds porteurs
Balagnicourt 8% de pieds porteurs

■ *Traiter le charançon du bourgeon terminal dans les 8 à 10 jours qui suivent les premières captures. Aidez-vous d'une cuvette jaune pour repérer son arrivée dans vos parcelles. Le seuil d'intervention contre les pucerons est de 10% de pieds porteurs (cas rare actuellement). Pour les altises, traiter après 20 à 30 captures cumulées en cuvette jaune (ne plus intervenir après le stade 6 feuilles).*

Phoma

Les projections significatives de spores de phoma ont débuté dans les régions limitrophes (Seine et Marne).

■ *Une intervention ne peut éventuellement se justifier dans les parcelles de variétés sensibles (Bristol) n'ayant pas encore atteint le stade 6 feuilles. Reportez-vous à notre bulletin n° 334 du 2 octobre.*



Prochain bulletin
prévu le 30 octobre.

COLZA : traiter les charançons du bourgeon terminal en Argonne.

CEREALES : surveiller les pucerons de près, le redoux va provoquer un accroissement des populations

738